

MENNYIT KELL HASZNÁLNIOM?

A GYÓGYSZERT MINDIG A KEZELŐORVOSA ÁLTAL ELMONDOTTAKNAK MEGFELELŐEN ALKALMAZZA. KEZELŐORVOSA AZT TANÁCSOLHATJA ÖNNEK, HOGY A KORÁBBI INZULINADAGJÁHOZ KÉPEST ELTÉRŐ SULIQUA-ADAGOT ALKALMAZZON. AMENNYIBEN NEM BIZTOS AZ ADAGOLÁST ILLETŐEN, KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT VAGY A GONDOZÁSÁT VÉGZŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBERT.

SULIQUA 100 Egység/ml + 50 mikrogramm/ml előretöltött injekciós toll:

- Az előretöltött injekciós tollal 10-40 egység közötti adag adható be egy injekcióban.
- Minden beállított adagolási egység 1 egységnyi glargin inzulin 100 Egység/ml-t és 0,5 mikrogramm lixiszenatidot tartalmaz.
- Az Ön Suliqua-adagját a beadandó „adagolási egységek” számával határozzák meg. Az injekciós tollon található adagkijelző ablak az adagolási egységek számát mutatja.

A pontos napi adagolás és titrálás érdekében tartsa be kezelőorvosa utasításait.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az ebben az útmutatóban foglalt utasításokat, hogy a lehető legtöbb előnye származzon a gyógyszer alkalmazásából! Ha kérdése van a SULIQUA vagy az új SoloStar® injekciós toll alkalmazása kapcsán, kérdezze meg kezelőorvosát.