

## A SULIQUA™ INJEKCIÓS TOLL TÁROLÁSA

- Olvassa el a gyógyszerhez mellékelt Betegtájékoztatót és Használati Útmutatót.
- Mindenképpen olvassa el és értelmezze az alábbi információkat, mielőtt első alkalommal használná a SULIQUA-t.
- A bontatlan SULIQUA injekciós tollak a lejáratási idő végéig tárolhatók hűtőszekrényben, felbontás után pedig 28 napig használhatók fel.

### AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT



Hűtőszekrényben, 2°C-8°C közötti hőmérsékleten tárolandó\*  
Nem fagyasztható, ne tegye fagyasztó mellé†



A fénytől való védelem érdekében tartsa a dobozában



A lejáratási idő elteltével dobja ki a készítményt


### AZ ELSŐ HASZNÁLATOT KÖVETŐEN, VAGY HA TARTALÉKKÉNT MAGÁNÁL TARTJA



Ne hűtse és ne fagyassza le a felbontott SoloStar® injekciós tollat  
Szobahőmérsékleten, 25°C alatt tárolandó



Tartsa távol közvetlen hőtől és fénytől. Minden injekció után tegye vissza a kupakot az injekciós tollra. Ne tárolja felhelyezett tűvel



Dobja ki 28 nappal a felbontás után

\*A SULIQUA beadása előtt legalább egy órával vegye ki a készítményt a hűtőszekrényből, mert a hideg inzulin beadása fájdalmas lehet.

†Ne fagyassza le a SULIQUA-t! Ne tegye fagyasztóba vagy jégakku mellé!  
Ha fagyást vagy jégkristályokat lát a SULIQUA oldatban, dobja ki.